

Laxoberal® Abführ-Tabletten. **Wirkst.:** Natriumpicosulfat. **Zusammens.:** *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 5,18 mg Natriumpicosulfat-Monohydrat/Tablette. *Sonst. Bestandteile:* Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, prägelatinierte Stärke, modifizierte Stärke, hochdisperses Siliciumdioxid. **Anw.-geb.:** Zur Anwendung bei Obstipation sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern. Wie andere Abführmittel sollte Laxoberal® ohne differentialdiagnostische Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. **Gegenanz.:** Ileus, Darmobstruktion, akute Bauchbeschwerden wie Appendizitis, akut entzündliche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, starke Bauchschmerzen in Verbindung mit Übelkeit und Erbrechen, schwere Dehydratation, Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, andere Triarylmethane oder einen der sonstigen Bestandteile, Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorbtion. Nicht anwenden bei Kindern unter 4 Jahren. **Nebenw.:** Abdominelle Beschwerden, Bauchschmerzen u. -krämpfe, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Schwindel und Synkope. **Warnhinw.:** Enthält Lactose. **Apothekenpflichtig.**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main

Stand: Juli 2022