

**Laxoberal®** Abführ-Tropfen. **Wirkst.:** Natriumpicosulfat **Zusammens.:** *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 7,78 mg Natriumpicosulfat-Monohydrat/1 ml. *Sonst. Bestandteile:* Natriumbenzoat, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Natriumcitrat-Dihydrat, Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser. **Anw.-geb.:** Zur Anwendung bei Obstipation sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern. Wie andere Abführmittel sollte Laxoberal®-ohne differentialdiagnostische Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. **Gegenanz.:** Ileus, Darmobstruktion, akute Bauchbeschwerden wie Appendizitis, akut entzündliche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, starke Bauchschmerzen in Verbindung mit Übelkeit und Erbrechen, schwere Dehydratation, Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, andere Triarylmethane oder einen der sonstigen Bestandteile, Unverträglichkeit gegenüber Sorbitol bzw. Fructose. Nicht anwenden bei Kindern unter 4 Jahren. **Nebenw.:** Abdominelle Beschwerden, Bauchschmerzen u. -krämpfe, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Schwindel und Synkope. **Warnhinw.:** Enthält Sorbitol und Natriumbenzoat. **Apothekenpflichtig.**

**A. Nattermann & Cie. GmbH**, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main.

**Stand:** November 2022