

Mucosolvan® 1mal täglich Retardkapseln.
Mucosolvan® Hustensaft 30 mg/5ml.
Mucosolvan® Kindersaft 30 mg/5ml.
Mucosolvan® Lutschpastillen 15 mg.
Mucosolvan® Hustensaft-Portionsbeutel 30 mg/5ml.

Wirkst.: Ambroxolhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Retardkapseln: Crospovidon, Carnaubawachs, Stearylalkohol, Magnesiumstearat, Gelatine, gereinigtes Wasser, Titandioxid, Eisenoxide, Schellack. Hustensaft: Benzoesäure, Hydroxyethylcellulose, Sucralose, Aromastoffe (enth. Propylenglycol), gereinigtes Wasser. Kindersaft: Benzoesäure, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Hydroxyethylcellulose, Glycerol 85 %, Acesulfam-Kalium, Aromastoffe (enthalten Propylenglycol), gereinigtes Wasser. Lutschpastillen: Arabisches Gummi, Sorbitol-Lösung 70%, Maltitol-Lösung, Mannitol, Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, dünnflüssiges Paraffin, Saccharin-Natrium, gereinigtes Wasser. Portionsbeutel: Acesulfam K, Benzoesäure, Zitronenaroma, Glycerol, Hyetellose, Sorbitol-Lösung (nicht kristallisierend), gereinigtes Wasser. Anw.-geb.: Sekretolytische Therapie bei akuten und chronischen bronchopulmonalen Erkrankungen, die mit einer Störung von Schleimbildung und -transport einhergehen. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff, Kinder unter 6 Jahren (nur Lutschpastillen) bzw. 12 Jahren (nur Retardkapseln und Portionsbeutel). Nur auf ärztliche Anweisung: Kinder unter 2 Jahren (nur Hustensaft und Kindersaft), Schwangerschaft, Stillzeit, beeinträchtigte Nierenfunktion, schwere Lebererkrankung, gestörte Bronchomotorik, größere Sekretmengen. Nebenw.: Überempfindlichkeitsreakt., anaphylakt. Reakt. incl. anaphylakt. Schock, Angioödem, Juckreiz, Hautausschlag, Urtikaria, schwere Hautreakt. (incl. E. multiforme, SJS, TEN, AGEP), Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Dyspepsie, Bauchschm., Sialorrhö, Dyspnoe, Fieber, Schleimhautreakt. Zusätzlich bei Hustensaft, Kindersaft, Lutschpastillen und Portionsbeutel: Geschmacksstörungen, Taubheitsgefühl im Mund, Mundtrockenh., Trockenh. im Hals, Taubheitsgef. im Rachen. Zusätzlich bei Portionsbeutel: Nasenfluss, Taubheitsgefühl im Kehlkopf, Verstopfung, Dysurie. Warnhinweis: Hustensaft: Enthält Benzoesäure und Propylenglycol. Kindersaft: Enthält Sorbitol, Benzoesäure und Propylenglycol. Lutschpastillen: Enthält Sorbitol, Maltitol, Pfefferminzöl und Eukalyptusöl. Portionsbeutel: Enthält Sorbitol, Benzoesäure sowie im Aroma einen geringen Alkoholanteil (weniger als 5 mg/Btl). Apothekenpflichtig.

A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningsstraße 50, 65929 Frankfurt am Main.

Stand: Juli 2022; Portionsbeutel: September 2023