

Bilastin STADA® 20 mg Tabletten

Wirkstoff: Bilastin.

Zus.: 1 Tabl. enth. 20 mg Bilastin (als Monohydrat). **Sonst. Bestandt.:** Mikrokrist. Cellulose (E460a), Crospovidon (Typ A), Mg-stearat (pflanzl.) (E470b), hochdisp. Siliciumdioxid (E 551).

Anw.: Symptomatisch. Behandl. d. allerg. Rhinokonjunktivitis (saisonal u. perennial) u. Urtik.; Anw. b. Erw. u. Jugendl. (ab 12 J.).

Gegenanz.: Überempfindg. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Orale Herpes, Appetitsteig., Angst, Schlaflosigkeit, Somnol., Kopfschm., Schwindelgefühl, Tinn., Vertigo, Rechtsschenkelblock, Sinusarrhythmie, EKG: QT-Verläng., and. EKG-Anomalien, Dyspnoe, Beschwerden a. d. Nase, trock. Nasenschleimhaut, Schmerzen i. Oberbauch, Abdominalschm., Übelk., Magenbeschwerden, Diarrhö, Mundtrockenh., Dyspepsie, Gastritis, Prur., Ermüd., Durst, vorbesteh. Erkrank. gebessert, Fieber, Asthenie, erhöhte Werte: GGT, AST, ALT; Kreatinin i. Blut, Triglyceride i. Blut; Gewicht erhöht, Palpitat., Tachyk., Überempfindg.reakt. (wie Anaphylaxie, Angioöd., Dyspnoe, Hautausschlag, lokalis. Öd./lokale Schwell. u. Erythem), Erbrechen., allerg. Konjunkt., Rhinitis, Bauchschm., Verlust d. Bewusstseins, Augenreiz., geschwoll. Lippe, Ekzem, Urtik.

Warnhinw.: Überschreiten Sie d. empfohl. Dosis nicht.

Beeintr. d. Reaktionsverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Januar 2025