

Silomat® Hustenlöser Ambroxolhydrochlorid 30 mg/5 ml Sirup

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid.

Zus.: 5 ml Sirup enth. 30 mg Ambroxolhydrochlorid. 1 ml Sirup enth. 6 mg Ambroxolhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.:** Hyetellose, Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristallis.) (E420), Glycerol (85%) (E422), Benzoesäure (E210), Acesulfam-K, Erdbeeraroma (Propylenglycol [E1520], Glycerol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on, Ethyllactat, Methylcinnamat, Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Butan-2,3-dion), Vanillearoma (Ammonsulfit-Zuckerkulör [E150d], Propylenglycol), gerein. Wasser.

Anw.: Mukolyt. Therapie b. bronchopulmon. Erkrank. m. gestört. Schleimbildung u. -transport b. Erw., Jugendl. u. Kdr. ab 2 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Kdr. unter 2 J.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf.reakt.; anaphylakt. Reakt. einschl. anaphylakt. Schock, Angioöd., Juckreiz; Dysgeusie (z.B. Veränd. d. Geschmacksempfind.), pharyng. Hypästhesie, Dyspnoe (als Sympt. e. Überempf.reakt.), Übelk., Taubh.gefühl i. Mund, Erbr., Diarrhö, Dyspepsie, Bauchschm., Mundtrockenh., Trockenh. i. Hals, Siallorrhö, Hautausschlag, Urtik., schwere Hautreakt. (einschl. Eryth. multif., SJS, TEN, AGEP), Fieber, Schleimhautreakt.

Warnhinw.: Enth. Benzoesäure, Sorbitol u. Propylenglycol.

Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Dezember 2024