

Silomat® Hustenlöser Ambroxolhydrochlorid 10 mg/Sprühstoß Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid.

Zus.: 1 ml Lsg. z. Einnehmen enth. 50 mg Ambroxolhydrochlorid. 1 Sprühstoß v. 0,2 ml enth. 10 mg Ambroxolhydrochlorid (50 mg/ml). **Sonst. Bestandt.:** Trometamol (z. pH-Einstell.), Macrogol-15-hydroxystearat, Glycerol, Acesulfam-Kalium, Xylitol, Na-benzoat (E211), Levomenthol, Ammoniumglycyrrhizat, Ethanol (96 Vol.-%), Na-hydroxid (z. pH-Einstell.), gerein. Wasser.

Anw.: B. Erw. u. Jugendl. ab 12 J. z. sekretolyt. Ther. b. akuten u. chron. bronchopulmon. Erkrank., d. m. e. Stör. v. Schleimbild. u. -transport einhergehen.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst., Levomenthol od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf.reakt., anaphylakt. Reakt. einschl. anaphylakt. Schock, Angioöd. u. Juckreiz; Übelk., Erbr., Magenschm., Hautausschlag, Urtik., schwere Hautreakt. einschl. Eryth. multiforme, SJS, TEN, AGEP; Atemnot, Fieber; Levomenthol: Überempf.reakt. (m. Dyspnoe/Atemnot) mögl.

Warnhinw.: Enth. e. geringen Alkoholanteil (weniger als 100 mg pro Einzelgabe) u. Levomenthol u. Na-benzoat.

Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel

Stand: November 2025