

Silomat® Hustenstiller Pentoxyverin 1,35 mg/ml Saft, Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff: Pentoxyverincitrat.

Zus.: 1 ml Lsg. z. Einnehm. enth. 2,13 mg Pentoxyverincitrat (entsprech. 1,35 mg Pentoxyverin). **Sonst. Bestandt.:** Citronensäure-Monohydrat (E330), Na-citrat 2 H₂O (E331), Glycerol 85% (E422), Propylenglycol (E1520), Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristall.) (E420), Saccharin-Na (E954), Methyl-4-hydroxybenzoat (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E216), Birnen-Aroma, Gin-Aroma (enth. Benzylalkohol), gerein. Wasser.

Anw.: Symptomat. Behandl. d. Reizhustens; Anw. b. Erw. u. Kdr. ab 2 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Ateminsuff. od. ZNS-Depress.; Leberinsuff.; Schwangersch.; Stillz; Kdr. i. d. ersten zwei Lebensjahren.

Schwangersch./Stillz.: Kontraind.

NW: Überempf.reakt. bis hin z. anaphylakt. Reakt., Somnol., Krampfanfälle, Dyspnoe (meist. i. Zusammenh. m. allerg. Reakt.), Atemdepress., Oberbauchschm., Diarrhö, Übelk., Erbrech., angioneurot. Öd., Urtik., Exanthem, Fatigue.

Warnhinw.: Enth. Methyl- u. Propyl-4-hydroxybenzoat, Sorbitol, Propylenglycol u. Natrium. Beeintr. d. Reakt.verm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Mai 2025